

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Groupe ESA  
Le Fallstaf  
ambrée

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode hybride	65	
Mercuriale	30	
Fumeterre	59	
Folle-avoine	38	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d1</p> <p>Chénopode hybride 11</p> <p>Mercuriale 2</p> <p>Fumeterre 23</p> <p>Folle-avoine 14</p>	<p>Association de cultures : Féverole de printemps Fort</p> <p>Chénopode hybride -10</p> <p>Mercuriale -10</p> <p>Fumeterre -10</p> <p>Folle-avoine -10</p>	<p>Date des faux semis : Août-d1 Jul-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode hybride -3</p> <p>Mercuriale -2</p> <p>Fumeterre -2</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Août-d1</p> <p>Chénopode hybride -1</p> <p>Mercuriale -1</p> <p>Fumeterre -1</p> <p>Folle-avoine -2</p>	<p>60 gr/m²</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Chénopode hybride -2</p> <p>Mercuriale -2</p> <p>Fumeterre -2</p> <p>Folle-avoine -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Fév-d2</p>	<p>Chénopode hybride 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Fumeterre 9</p> <p>Folle-avoine 1</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Nov-d1 Chénopode hybride 8 Mercuriale 9 Fumeterre 24 Folle-avoine 15	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode hybride -6 Mercuriale -6 Fumeterre -6 Folle-avoine -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1   Aoû-d1 Oct-d1   Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode hybride -3 Mercuriale -4 Fumeterre -4 Folle-avoine -3	<b>Date de labour</b> Oct-d1 Chénopode hybride -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -2	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Chénopode hybride 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Chénopode hybride -2 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folle-avoine -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Chénopode hybride -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Nov-d1   Mar-d2 Herse étrille : Chénopode hybride 0 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -0	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d2	<b>Score annuel</b> Chénopode hybride 0 Mercuriale 0 Fumeterre 9 Folle-avoine 1

## Année 3 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> Fév-d2 Chénopode hybride 46 Mercuriale 3 Fumeterre 64 Folle-avoine 80	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Chénopode hybride -4 Mercuriale -4 Fumeterre -4 Folle-avoine -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d1   Jul-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d2 Chénopode hybride -3 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folle-avoine 0	<b>Date de labour</b> Fév-d2 Chénopode hybride -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -3	<b>Densité de semis</b> 80 gr/m² Chénopode hybride 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Chénopode hybride 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Variété</b> Non couvrante Chénopode hybride 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode hybride 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d2   Fév-d2	<b>Score annuel</b> Chénopode hybride 38 Mercuriale 0 Fumeterre 58 Folle-avoine 73

## Année 4 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <b>Mar-d2</b> Chénopode hybride 81 Mercuriale 30 Fumeterre 50 Folle-avoine 90	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Chénopode hybride -4 Mercuriale -4 Fumeterre -4 Folle-avoine -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d2 Chénopode hybride -3 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folle-avoine 0	<b>Date de labour</b> <b>Fév-d2</b> Chénopode hybride -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -3	<b>Densité de semis</b> 115000 gr/m² Chénopode hybride 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 50 cm Chénopode hybride 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Chénopode hybride -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Avr-d2 Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode hybride -8 Mercuriale -3 Fumeterre -5 Folle-avoine -8	<b>Désherbage chimique</b> <b>Mai-d2</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode hybride 64 Mercuriale 19 Fumeterre 37 Folle-avoine 74

## Année 5 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> <b>Mar-d1</b> Chénopode hybride 73 Mercuriale 16 Fumeterre 57 Folle-avoine 93	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Chénopode hybride -10 Mercuriale -10 Fumeterre -10 Folle-avoine -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode hybride 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0	<b>Date de labour</b> <b>Fév-d1</b> Chénopode hybride -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -2	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Chénopode hybride 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Chénopode hybride -2 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folle-avoine -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Chénopode hybride -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folle-avoine -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Mar-d2 Herse étrille : Chénopode hybride -8 Mercuriale -3 Fumeterre -5 Folle-avoine -8	<b>Désherbage chimique</b> <b>Mai-d2</b>	<b>Score annuel</b> Chénopode hybride 52 Mercuriale 0 Fumeterre 38 Folle-avoine 70

## Année 6 - Pomme de terre

### Date de semis

Avr-d2

Chénopode hybride

79

Mercuriale 92

Fumeterre 32

Folle-avoine 56

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Chénopode hybride

0

Mercuriale 0

Fumeterre 0

Folle-avoine 0

### Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d1 Jul-d1

Date de semis du couvert :

Aoû-d1

Date de destruction :

Mar-d2

Chénopode hybride

-3

Mercuriale -2

Fumeterre -2

Folle-avoine 0

### Date de labour

Mar-d2

Chénopode hybride

-1

Mercuriale -1

Fumeterre -1

Folle-avoine -3

### Densité de semis

40000 gr/m²

Chénopode hybride

0

Mercuriale 0

Fumeterre 0

Folle-avoine 0

### Entre rangs

80 cm

Chénopode hybride

0

Mercuriale 0

Fumeterre 0

Folle-avoine 0

### Variété

Non couvrante

Chénopode hybride

0

Mercuriale 0

Fumeterre 0

Folle-avoine 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode hybride

0

Mercuriale 0

Fumeterre 0

Folle-avoine 0

### Désherbage chimique

Mai-d2

Avr-d2

### Score annuel

Chénopode hybride

75

Mercuriale 89

Fumeterre 29

Folle-avoine 52