

Exploitation : Syppre_inov
 Parcelle : P4
 Type de sol : argilo-limoneu

Commentaires :

Choix de cette parcelle pour pouvoir faire des simulations ensuite en changeant la CIVE dans la rotation

Parcelle 4, informations manquantes : -densité de semis en gr/m² -entre rang?

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	14

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Autre culture d'hiver Moyen Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Nov-d1 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 288 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d3 Fév-d3 Ray-grass 10	Score annuel Ray-grass 10

Année 2 - Orge d'hiver				
Date de semis Oct-d3 Ray-grass 31	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 211 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d1 Jan-d3 Ray-grass 19	Score annuel Ray-grass 19

Année 3 - Triticale

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 48	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 406 gr/m ² Ray-grass -2
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Avr-d3 Ray-grass 39	Score annuel

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis Avr-d3 Ray-grass 12	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 37 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 40 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Jul-d3 Ray-grass 11	Score annuel

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis Jan-d2 Ray-grass 4	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Oct-d2 Ray-grass -3	Densité de semis 98 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 14 cm Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d3 Mar-d2 Ray-grass 0	Score annuel