

Exploitation : Syppre_inov
 Parcelle : P4
 Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Choix de cette parcelle pour pouvoir faire des simulations ensuite en changeant la CIVE dans la rotation, parcelle avec une forte pression ray grass observée sur les 5 premières années du système

Parcelle 4, informations manquantes : -densité de semis en gr/m² -entre rang?

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	24
Coquelicot	53
Séneçon vulgaire	47
Chénopode	30
Vulpin	19

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Ray-grass 96 Coquelicot 41 Séneçon vulgaire 25 Chénopode 31 Vulpin 89	Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort Ray-grass -10 Coquelicot -10 Séneçon vulgaire -10 Chénopode -10 Vulpin -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -2 Vulpin -1	Pas de labour Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	38 gr/m ² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 60 cm Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Mar-d2 Sep-d3	Score annuel Ray-grass 86 Coquelicot 31 Séneçon vulgaire 14 Chénopode 19 Vulpin 77

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div> Nov-d1 </div> <div> Ray-grass 18 Coquelicot 46 Séneçon vulgaire 36 Chénopode 6 Vulpin 14 </div>	<p>Association de cultures : Autre culture d'hiver Moyen</p> <div> Ray-grass -6 Coquelicot -6 Séneçon vulgaire -6 Chénopode -6 Vulpin -6 </div>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Nov-d1</p> <div> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0 </div>	<div> Pas de labour </div> <div> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0 </div>	<p>280 gr/m²</p> <div> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0 </div>
<p>Entre rangs</p> <p>17.5 cm</p> <div> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0 </div>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <div> Ray-grass -1 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Vulpin -1 </div>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <div> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0 </div>	<p>Désherbage chimique</p> <div> Mar-d3 Fév-d3 </div>	<p>Score annuel</p> <div> Ray-grass 11 Coquelicot 39 Séneçon vulgaire 29 Chénopode 0 Vulpin 7 </div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div> Oct-d3 </div> <div> Ray-grass 31 Coquelicot 50 Séneçon vulgaire 38 Chénopode 2 Vulpin 31 </div>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <div> Ray-grass -10 Coquelicot -10 Séneçon vulgaire -10 Chénopode -10 Vulpin -10 </div>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <div> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0 </div>	<div> Pas de labour </div> <div> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0 </div>	<p>250 gr/m²</p> <div> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0 </div>
<p>Entre rangs</p> <p>17.5 cm</p> <div> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0 </div>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <div> Ray-grass -1 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Vulpin -1 </div>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <div> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0 </div>	<p>Désherbage chimique</p> <div> Jan-d3 Mar-d1 </div>	<p>Score annuel</p> <div> Ray-grass 20 Coquelicot 39 Séneçon vulgaire 27 Chénopode 0 Vulpin 20 </div>

Année 4 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 59	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 5	Chénopode -6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 41 Coquelicot 52 Séneçon vulgaire 31 Chénopode 0 Vulpin 39
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	30 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 52	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jul-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d3	Ray-grass 11 Coquelicot 27 Séneçon vulgaire 49 Chénopode 53 Vulpin 14
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -1		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2 Ray-grass 4 Coquelicot 11 Séneçon vulgaire 11 Chénopode 8 Vulpin 14	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire -2 Chénopode -0 Vulpin -4	Oct-d2 Ray-grass -3 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Vulpin -4	100 gr/m ² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Mar-d3 Mar-d2	Score annuel Ray-grass 0 Coquelicot 8 Séneçon vulgaire 7 Chénopode 6 Vulpin 5