

Exploitation : Syppre\_inov  
 Parcelle : P5  
 Type de sol : argilo-calcaire

## Commentaires :

Parcelle avec deux cultures d'été, faible pression Ray grass sur celle-ci, comparé aux autres

## Adventices étudiées :

| Adventices :    | Risque : |
|-----------------|----------|
| Ray-grass       | 27       |
| Coquelicot      | 57       |
| Renouée liseron | 24       |
| Chénopode       | 49       |
| Matricaire      | 63       |

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|--|--|--|---|--|
| Oct-d3   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible  | Date des faux semis :<br>Aoû-d2 Non définie<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour   | 59 gr/m <sup>2</sup>   |
| Ray-grass 35<br>Coquelicot 55<br>Renouée liseron 1<br>Chénopode 8<br>Matricaire 26 | Ray-grass -4<br>Coquelicot -4<br>Renouée liseron -4<br>Chénopode -4<br>Matricaire -4 | Ray-grass -3<br>Coquelicot -0<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode -2<br>Matricaire -1  | Ray-grass 0<br>Coquelicot 0<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Matricaire 0 | Ray-grass 0<br>Coquelicot 0<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Matricaire 0    |
| Entre rangs  | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 17.5 cm  | Non couvrante  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Déc-d2 Avr-d2   | Ray-grass 28<br>Coquelicot 51<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 3<br>Matricaire 21 |
| Ray-grass 0<br>Coquelicot 0<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Matricaire 0    | Ray-grass 0<br>Coquelicot 0<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Matricaire 0      | Ray-grass 0<br>Coquelicot 0<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Matricaire 0  |   |  |

## Année 2 - Tournesol

| Date de semis       | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour             | Densité de semis  |
|---------------------|--|--|----------------------------|---|
| <b>Avr-d2</b>       | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><b>Oct-d2</b><br>Date de destruction :<br><b>Mar-d1</b> | <b>Pas de labour</b>       | Non défini  |
| Ray-grass 19        | Ray-grass 0  | Ray-grass 0  | Ray-grass 0                | Ray-grass 0   |
| Coquelicot 38       | Coquelicot 0                                       | Coquelicot 0   | Coquelicot 0               | Coquelicot 0  |
| Renouée liseron 127 | Renouée liseron 0                                  | Renouée liseron 0  | Renouée liseron 0          | Renouée liseron 0   |
| Chénopode 63        | Chénopode 0  | Chénopode 0  | Chénopode 0                | Chénopode 0   |
| Matricaire 42       | Matricaire 0                                       | Matricaire 0   | Matricaire 0               | Matricaire 0  |
| <b>Entre rangs</b>  | <b>Variété</b>                                     | <b>Désherbage mécanique</b>  | <b>Désherbage chimique</b> | <b>Score annuel</b>   |
| 60 cm               | Moyennement couvrante                              | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | <b>Avr-d2</b>              | Ray-grass 18<br>Coquelicot 37<br>Renouée liseron 126<br>Chénopode 62<br>Matricaire 41 |
| Ray-grass 0         | Ray-grass -1                                       | Ray-grass 0  |                            |   |
| Coquelicot 0        | Coquelicot -1                                      | Coquelicot 0   |                            |   |
| Renouée liseron 0   | Renouée liseron -1                                 | Renouée liseron 0  |                            |   |
| Chénopode 0         | Chénopode -1                                       | Chénopode 0  |                            |   |
| Matricaire 0        | Matricaire -1                                      | Matricaire 0   |                            |   |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis      | Étouffement culture                          | Interculture   | Date de labour             | Densité de semis   |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|
| <b>Oct-d3</b>      | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><b>Non définie</b><br>Date de destruction :<br><b>Non définie</b> | <b>Pas de labour</b>       | 280 gr/m <sup>2</sup>  |
| Ray-grass 35       | Ray-grass -6                                 | Ray-grass 0  | Ray-grass 0                | Ray-grass 0  |
| Coquelicot 55      | Coquelicot -6                                | Coquelicot 0   | Coquelicot 0               | Coquelicot 0   |
| Renouée liseron 1  | Renouée liseron -6                           | Renouée liseron 0  | Renouée liseron 0          | Renouée liseron 0  |
| Chénopode 8        | Chénopode -6                                 | Chénopode 0  | Chénopode 0                | Chénopode 0  |
| Matricaire 26      | Matricaire -6                                | Matricaire 0   | Matricaire 0               | Matricaire 0   |
| <b>Entre rangs</b> | <b>Variété</b>                               | <b>Désherbage mécanique</b>  | <b>Désherbage chimique</b> | <b>Score annuel</b>  |
| 17.5 cm            | Moyennement couvrante                        | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | <b>Avr-d2</b>              | Ray-grass 28<br>Coquelicot 48<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 1<br>Matricaire 19 |
| Ray-grass 0        | Ray-grass -1                                 | Ray-grass 0  |                            |  |
| Coquelicot 0       | Coquelicot -1                                | Coquelicot 0   |                            |  |
| Renouée liseron 0  | Renouée liseron -1                           | Renouée liseron 0  |                            |  |
| Chénopode 0        | Chénopode -1                                 | Chénopode 0  |                            |  |
| Matricaire 0       | Matricaire -1                                | Matricaire 0   |                            |  |

## Année 4 - Autre culture de print.

| Date de semis      | Étouffement culture                                | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis  |
|--------------------|--|---|---------------------|-------------------|
| Fév-d3             | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Oct-d1 Sep-d1<br>Aoû-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | Non défini        |
| Ray-grass 28       | Ray-grass 0  | Ray-grass -12   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0       |
| Coquelicot 41      | Coquelicot 0                                       | Coquelicot -5   | Coquelicot 0        | Coquelicot 0      |
| Renouée liseron 19 | Renouée liseron 0                                  | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 49       | Chénopode 0  | Chénopode -4  | Chénopode 0         | Chénopode 0       |
| Matricaire 46      | Matricaire 0                                       | Matricaire -4   | Matricaire 0        | Matricaire 0      |
| Entre rangs        | Variété  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel      |
| 60 cm              | Moyennement couvrante                              | Bineuse :<br>Mai-d1 Avr-d2<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Mar-d1 Fév-d3       | Ray-grass 12      |
| Ray-grass 0        | Ray-grass -1                                       | Ray-grass -2  | Ray-grass 0         | Coquelicot 30     |
| Coquelicot 0       | Coquelicot -1                                      | Coquelicot -4   | Coquelicot 0        | Renouée liseron 6 |
| Renouée liseron 0  | Renouée liseron -1                                 | Renouée liseron -12   | Renouée liseron 0   | Chénopode 37      |
| Chénopode 0        | Chénopode -1                                       | Chénopode -6  | Chénopode 0         | Matricaire 36     |
| Matricaire 0       | Matricaire -1                                      | Matricaire -4   | Matricaire 0        |                   |

## Année 5 - Colza d'hiver

| Date de semis     | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis  |
|-------------------|---|--|---------------------|-------------------|
| Aoû-d1            | Association de cultures :<br>Autre culture d'hiver<br>Moyen | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | Non défini        |
| Ray-grass 73      | Ray-grass -6  | Ray-grass 0  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0       |
| Coquelicot 19     | Coquelicot -6   | Coquelicot 0   | Coquelicot 0        | Coquelicot 0      |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6  | Renouée liseron 0  | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 35      | Chénopode -6  | Chénopode 0  | Chénopode 0         | Chénopode 0       |
| Matricaire 30     | Matricaire -6   | Matricaire 0   | Matricaire 0        | Matricaire 0      |
| Entre rangs       | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel      |
| 60 cm             | Moyennement couvrante                                       | Bineuse :<br>Sep-d3 Sep-d2<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :   | Nov-d2 Avr-d2       | Ray-grass 56      |
| Ray-grass 0       | Ray-grass -1  | Ray-grass -10  | Ray-grass 0         | Coquelicot 7      |
| Coquelicot 0      | Coquelicot -1   | Coquelicot -5  | Coquelicot 0        | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -1  | Renouée liseron 0  | Renouée liseron 0   | Chénopode 25      |
| Chénopode 0       | Chénopode -1  | Chénopode -3   | Chénopode 0         | Matricaire 20     |
| Matricaire 0      | Matricaire -1   | Matricaire -3  | Matricaire 0        |                   |