

Exploitation : Earl Lefebvre
Parcelle : La bien assise
Type de sol : limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	48	
Ray-grass	49	
Folle-avoine	32	

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis Sép-d3 Vulpin 100 Ray-grass 80 Folle-avoine 28	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Folle-avoine -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sép-d3 Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 333 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 17 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique Oct-d3	Score annuel Vulpin 89 Ray-grass 69 Folle-avoine 17

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Folle-avoine 34</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Folle-avoine -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 400 gr/m² <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Folle-avoine -2</div>
Entre rangs 17 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 80</div> <div>Ray-grass 62</div> <div>Folle-avoine 27</div>

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Folle-avoine 81</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Mar-d2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Densité de semis 10 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Folle-avoine 81</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Oct-d2	Pas de labour	400 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mar-d2	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 53
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 45
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 19

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d2	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 80
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 87
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 19

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis

Avr-d2

Vulpin 21

Ray-grass 19

Folle-avoine 56

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin 0

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Aoû-d2

Date de destruction :

Mar-d3

Vulpin 0

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Densité de semis

4 gr/m²

Vulpin 0

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Entre rangs

90 cm

Vulpin 0

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin -1

Ray-grass -1

Folle-avoine -1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin 0

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Désherbage chimique

Mai-d1

Score annuel

Vulpin 20

Ray-grass 18

Folle-avoine 55