

Exploitation : GAEC du Vallonnais  
 Parcelle : GUINDE  
 Type de sol : argile

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	35
Ray-grass	31
Chénopode	55

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Maïs Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Sep-d1	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87 Ray-grass 69 Chénopode 15	Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -3 Ray-grass -3 Chénopode -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Aoû-d1	Vulpin 79 Ray-grass 62 Chénopode 10
Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0			

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Blé d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d2	8.5 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Ray-grass 19	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Chénopode 68	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
22 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Aoû-d2 Herse étrille :	Aoû-d2	Vulpin 7 Ray-grass 5 Chénopode 55
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		