

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : En biarre
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	35
Vulpin	42
Chénopode	41
Ray-grass	45

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Aoû-d3	40 gr/m ² Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0
Gaillet 25 Vulpin 89 Chénopode 31 Ray-grass 96	Gaillet -6 Vulpin -6 Chénopode -6 Ray-grass -6		Gaillet -4 Vulpin -6 Chénopode -2 Ray-grass -6	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Aoû-d3	Gaillet 12 Vulpin 74 Chénopode 20 Ray-grass 81
Gaillet -2 Vulpin -2 Chénopode -2 Ray-grass -2	Gaillet -1 Vulpin -1 Chénopode -1 Ray-grass -1			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	240 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Gaillet 84 Vulpin 46 Chénopode 4 Ray-grass 40
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d3	Nov-d3	100 gr/m ²
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d1 Mar-d3	Gaillet 0 Vulpin 30 Chénopode 58 Ray-grass 27
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -4		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	240 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Gaillet 84 Vulpin 46 Chénopode 4 Ray-grass 40
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		