

Exploitation : GAEC Clavreul  
 Parcelle : La Ménage 2  
 Type de sol : limon sur schiste

## Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	23
Ray-grass	15
Renouée des oiseaux	46

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Avr-d2	Avr-d2	9.5 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 44 Ray-grass 12 Renouée des oiseaux 92	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Folle-avoine -12 Ray-grass -8 Renouée des oiseaux -6	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Avr-d3 Mai-d3	Folle-avoine 32 Ray-grass 4 Renouée des oiseaux 86
Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0	Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0			

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	330 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14.3 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Nov-d3	Folle-avoine 14 Ray-grass 29 Renouée des oiseaux 3
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		