

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Le clot de la croix 1*
 Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	43
Mouron	64
Panic pied-de-coq	31

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d2	10 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
75 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0	Très couvrante	Bineuse : Jun-d1		Chénopode 46
Mouron 0	Chénopode -2	Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mai-d1		Mouron 82
Panic pied-de-coq 0	Mouron -2	Chénopode -8		Panic pied-de-coq 62
	Panic pied-de-coq -2	Mouron -14		
		Panic pied-de-coq -7		

Année 2 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	250 gr/m ²
Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -10 Mouron -10 Panic pied-de-coq -10	Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1	Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1	Avr-d2	10 gr/m ²
Chénopode 57 Mouron 99 Panic pied-de-coq 73	Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1	Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Mai-d1		Chénopode 46 Mouron 82 Panic pied-de-coq 62
Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Chénopode -8 Mouron -14 Panic pied-de-coq -7		

Année 4 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	250 gr/m ²
Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -10 Mouron -10 Panic pied-de-coq -10	Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Chénopode -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1	Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0		Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2			