

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	47
Brome mou	56
Chénopode	8

Situation initiale :

Année 1 - Triciale					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Pois de printemps Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	275 gr/m ²	
Vulpin 56 Brome mou 69 Chénopode 5	Vulpin -10 Brome mou -10 Chénopode -10	Vulpin 0 Brome mou 0 Chénopode 0	Vulpin -9 Brome mou -7 Chénopode -1	Vulpin 0 Brome mou 0 Chénopode 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d3 Herse étrille : Oct-d3		Vulpin 28 Brome mou 43 Chénopode 0	
Vulpin 0 Brome mou 0 Chénopode 0	Vulpin -2 Brome mou -2 Chénopode -2	Vulpin -8 Brome mou -7 Chénopode -1			

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 83 Brome mou 92 Chénopode 9	Vulpin 0 Brome mou 0 Chénopode 0	Date de destruction : Non définie	Vulpin 0 Brome mou 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Brome mou 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 83 Brome mou 92 Chénopode 9
Vulpin 0 Brome mou 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Brome mou 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Brome mou 0 Chénopode 0		