

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

L'E.A.R.L. des Courtis
Le fond du larry
Sol argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	43	
Vulpin	42	
Chénopode	65	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Folle-avoine 56 Vulpin 21 Chénopode 68	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Jan-d2 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode -2	Date de labour Pas de labour Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 200 gr/m² Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 75 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Jun-d1 Mai-d1 Avr-d1	Score annuel Folle-avoine 56 Vulpin 21 Chénopode 66

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Folle-avoine 34

Vulpin 87

Chénopode 15

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Folle-avoine -4

Vulpin -4

Chénopode -4

Interculture

Date des faux semis :

Sep-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Folle-avoine -1

Vulpin -4

Chénopode -2

Date de labour

Pas de labour

Folle-avoine 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Densité de semis

300 gr/m²

Folle-avoine 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Entre rangs

25 cm

Folle-avoine 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Variété

Non couvrante

Folle-avoine 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Folle-avoine 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Désherbage chimique

Oct-d1

Score annuel

Folle-avoine 28

Vulpin 79

Chénopode 10