

Exploitation : L'E.A.R.L. des Courtis  
 Parcelle : Le fond du larry  
 Type de sol : Sol argilo-calcaire

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	40
Vulpin	37
Chénopode	62

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Jan-d2	Avr-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 41	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mai-d1 Jun-d1	Folle-avoine 35 Vulpin 12 Chénopode 64
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m <sup>2</sup>
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Folle-avoine 28 Vulpin 79 Chénopode 10
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		