

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC du Manoir d'Aubigny
Lecourt
Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	16	
Chénopode	58	
Morelle	14	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Ray-grass 27</p> <p>Chénopode 71</p> <p>Morelle 25</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2</p> <p>Date de destruction : Avr-d1</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Mar-d3</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Morelle -1</p>	<p>9.5 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>75 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Morelle -1</p>	<p>Bineuse : Avr-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Jun-d1</p>	<p>Ray-grass 22</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Morelle 23</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass 18

Chénopode 6

Morelle 0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass -4

Chénopode -4

Morelle -4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du
couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass 0

Chénopode 0

Morelle 0

Date de labour

Oct-d3

Ray-grass -3

Chénopode -1

Morelle -1

Densité de semis

9.5 gr/m²

Ray-grass 0

Chénopode 0

Morelle 0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass -1

Chénopode -1

Morelle -1

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass -1

Chénopode -1

Morelle -1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :

Oct-d3

Herse étrille :

Ray-grass 0

Chénopode 0

Morelle 0

Désherbage chimique

Nov-d3

Avr-d3

Mar-d3

Score annuel

Ray-grass 10

Chénopode 0

Morelle 0