

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC DELBOS
L'Espinasse3
Limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------|----------|--|
| Chénopode | 47 | |
| Amarante réfléchie | 51 | |
| Renouée liseron | 46 | |

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|--|---|
| <p>Mai-d2</p> <p>Chénopode 52</p> <p>Amarante réfléchie 95</p> <p>Renouée liseron 111</p> | <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Date des faux semis : Oct-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Nov-d2</p> <p>Date de destruction : Mai-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Avr-d3</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Amarante réfléchie -2</p> <p>Renouée liseron -6</p> | <p>10 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>70 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> | <p>Très couvrante</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Amarante réfléchie -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> | <p>Bineuse : Jun-d1</p> <p>Houe rotative : Jun-d1</p> <p>Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2</p> <p>Chénopode -7</p> <p>Amarante réfléchie -12</p> <p>Renouée liseron -17</p> | <p>Jun-d2 Mai-d2</p> | <p>Chénopode 40</p> <p>Amarante réfléchie 79</p> <p>Renouée liseron 86</p> |

Année 2 - Maïs

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Date de semis Mai-d2 Chenopode 52 Amarante réfléchie 95 Renouée liseron 111 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chenopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Nov-d2 Date de destruction : Mai-d1 Chenopode -1 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Date de labour Avr-d3 Chenopode -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -6 | Densité de semis 10 gr/m² Chenopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs 70 cm Chenopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Variété Très couvrante Chenopode -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Jun-d1 Herse étrille : Avr-d2 Mai-d2 Chenopode -7 Amarante réfléchie -12 Renouée liseron -17 | Désherbage chimique Jun-d2 Mai-d2 | Score annuel Chenopode 40 Amarante réfléchie 79 Renouée liseron 86 |

Année 3 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Date de semis Oct-d2 Chenopode 11 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 1 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chenopode -4 Amarante réfléchie -4 Renouée liseron -4 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chenopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Date de labour Pas de labour Chenopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Densité de semis 100 gr/m² Chenopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs 5 cm Chenopode -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2 | Variété Moyennement couvrante Chenopode -1 Amarante réfléchie -1 Renouée liseron -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chenopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 | Désherbage chimique | Score annuel Chenopode 4 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0 |