

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Cuma des villages
Ouville
Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	68	
Ray-grass	29	
Renouée liseron	36	

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis Mar-d3 Chénopode 66 Ray-grass 33 Renouée liseron 85	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Interculture Date des faux semis : Août-d3 Août-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d1 Chénopode -3 Ray-grass -6 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 650 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 14 cm Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Mai-d2 Avr-d3 Mar-d3	Score annuel Chénopode 63 Ray-grass 27 Renouée liseron 85

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	200 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Nov-d2 Oct-d3	Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Ray-grass 30
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d1	Mar-d2	15 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d3	Chénopode 57
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Ray-grass 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Renouée liseron 48
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7		