

Exploitation : Cuma des villages  
 Parcelle : Ouville  
 Type de sol : Limon-argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	68
Ray-grass	29
Renouée liseron	36

### Situation initiale :

#### Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3  Chénopode 66 Ray-grass 33 Renouée liseron 85	Association de cultures : Aucune Très faible  Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d1  Chénopode -3 Ray-grass -6 Renouée liseron 0	Pas de labour  Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	650 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm  Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Non couvrante  Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Mai-d2 Avr-d3 Mar-d3  Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Chénopode 63 Ray-grass 27 Renouée liseron 85

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	200 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11 Ray-grass 52 Renouée liseron 1	Chénopode -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4	Chénopode -3 Ray-grass -10 Renouée liseron 0	Chénopode -1 Ray-grass -6 Renouée liseron -3	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Déc-d1 Nov-d2 Oct-d3	Chénopode 0 Ray-grass 30 Renouée liseron 0
Chénopode -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1	Chénopode -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1			

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d1	Mar-d2	15 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 64 Ray-grass 35 Renouée liseron 58	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Chénopode -2 Ray-grass -3 Renouée liseron 0	Chénopode -2 Ray-grass -4 Renouée liseron -3	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Ray-grass -1 Renouée liseron -7	Avr-d2 Mar-d3	Chénopode 57 Ray-grass 27 Renouée liseron 48
Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0			