

Exploitation : EARL Douceron
Parcelle : La fosse
Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	13	
Folle-avoine	57	
Chénopode	80	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Folle-avoine 69</div> <div>Chénopode 66</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Août-d2</div> <div>Août-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Août-d2</div> Date de destruction : <div>Mar-d1</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Folle-avoine -0</div> <div>Chénopode -3</div>	Date de labour <div>Fév-d1</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Folle-avoine -9</div> <div>Chénopode -3</div>	Densité de semis 10 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -3</div> <div>Folle-avoine -7</div> <div>Chénopode -7</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 13</div> <div>Folle-avoine 53</div> <div>Chénopode 53</div>