

Exploitation : EARL Douceron  
Parcelle : La fosse  
Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	15	
Folle-avoine	61	
Chénopode	74	

## Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d3</p> <p>Ray-grass 33</p> <p>Folle-avoine 81</p> <p>Chénopode 66</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d2</p> <p>Date de destruction : Mar-d1</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Folle-avoine -0</p> <p>Chénopode -3</p>	<p>Mar-d1</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Folle-avoine -13</p> <p>Chénopode -4</p>	<p>10 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Avr-d3 Avr-d2</p> <p>Houe rotative : Avr-d1</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Folle-avoine -11</p> <p>Chénopode -10</p>	<p>Avr-d3 Mai-d1</p>	<p>Ray-grass 15</p> <p>Folle-avoine 57</p> <p>Chénopode 49</p>