

Exploitation : GAEC Bernard
 Parcelle : 1
 Type de sol : Limoneux sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	8

Situation initiale :

Année 1 - Maïs				
Date de semis Mai-d1 Ray-grass 6	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Nov-d1 Date de destruction : Fév-d3 Ray-grass 0	Date de labour Avr-d3 Ray-grass -2	Densité de semis gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 50 cm Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Jun-d2 Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel Ray-grass 1
Année 2 - Blé d'hiver				
Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Nov-d1 Ray-grass -2	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm Ray-grass 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d2 Jul-d1	Score annuel Ray-grass 10

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Fév-d3 Ray-grass 28	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Jan-d3 Ray-grass -2	Densité de semis 150 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 30 cm Ray-grass 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d2	Score annuel Ray-grass 14