

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Ferme des Cheigneux  
le moulin  
argile

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	0
Renouée liseron	61
Vulpin	0

## Situation initiale :

### Année 1 - Pomme de terre

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Ray-grass 19 Renouée liseron 127 Vulpin 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Vulpin -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d3 Ray-grass -4 Renouée liseron 0 Vulpin -3	<b>Date de labour</b> Mar-d3 Ray-grass -9 Renouée liseron -8 Vulpin -12	<b>Densité de semis</b> 6 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Vulpin -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Non définie Houe rotative : Mai-d3 Mai-d1 Herse étrille : Mai-d3 Mai-d1 Ray-grass -1 Renouée liseron -27 Vulpin -2	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 0 Renouée liseron 87 Vulpin 0

## Année 2 - Epinard

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2	Mai-d1	20 gr/m²
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Date de semis du couvert : Sep-d1	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Date de destruction : Déc-d1	Renouée liseron -12	Renouée liseron 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Ray-grass -3	Vulpin -10	Vulpin 0
		Renouée liseron 0		
		Vulpin -1		

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jun-d1	Jun-d1 Non définie	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Houe rotative : Jul-d1 Jun-d1		Renouée liseron 77
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Herse étrille : Jul-d1 Jun-d1		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Ray-grass 0		
		Renouée liseron -20		
		Vulpin 0		

## Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2	Mai-d1	10 gr/m²
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Date de semis du couvert : Sep-d1	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Renouée liseron 110	Renouée liseron 0	Date de destruction : Déc-d2	Renouée liseron -12	Renouée liseron 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Ray-grass -3	Vulpin -10	Vulpin 0
		Renouée liseron 0		
		Vulpin -1		

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1	Jul-d1 Non définie	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Houe rotative : Jun-d3 Jun-d1		Renouée liseron 76
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Herse étrille : Jul-d1 Jun-d1		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Ray-grass 0		
		Renouée liseron -21		
		Vulpin 0		