

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Le clot de la croix 1
Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	43	
Mouron	64	
Panic pied-de-coq	31	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Mai-d1 Chénopode 57 Mouron 99 Panic pied-de-coq 73	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Date de labour Avr-d2 Chénopode -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1	Densité de semis 10 gr/m² Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d2 Chénopode -8 Mouron -14 Panic pied-de-coq -7	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 46 Mouron 82 Panic pied-de-coq 62

Année 2 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	250 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1	Avr-d2	10 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d2		Chénopode 46
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -8		Mouron 82
Mouron 0	Mouron -2	Mouron -14		Panic pied-de-coq 62
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -7		

Année 4 - Triticale

Date de semis

Nov-d1

Chénopode 0

Mouron 0

Panic pied-de-coq
0

Étouffement culture

Association de cultures :
Pois d'hiver
Fort

Chénopode -10

Mouron -10

Panic pied-de-coq -10

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du
couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode 0

Mouron 0

Panic pied-de-coq
0

Date de labour

Nov-d1

Chénopode -1

Mouron -1

Panic pied-de-coq
-1

Densité de semis

250 gr/m²

Chénopode 0

Mouron 0

Panic pied-de-coq
0

Entre rangs

12 cm

Chénopode -2

Mouron -2

Panic pied-de-coq
-2

Variété

Très couvrante

Chénopode -2

Mouron -2

Panic pied-de-coq -2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode 0

Mouron 0

Panic pied-de-coq
0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 0

Mouron 0

Panic pied-de-coq
0