

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : Le clot de la croix 2
 Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	44
Mouron	64
Panic pied-de-coq	26

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d2	10 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Panic pied-de-coq 73	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d2		Chénopode 44
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -10		Mouron 78
Mouron 0	Mouron -2	Mouron -18		Panic pied-de-coq 59
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -11		

Année 2 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Association de cultures : Pois d'hiver Fort Chénopode -10 Mouron -10 Panic pied-de-coq -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Nov-d1 Chénopode -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1	250 gr/m ² Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 12 cm Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Variété Très couvrante Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Chénopode 62 Mouron 102 Panic pied-de-coq 52	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1 Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Avr-d2 Chénopode -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1	10 gr/m ² Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Avr-d3 Chénopode -8 Mouron -13 Panic pied-de-coq -5	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 51 Mouron 85 Panic pied-de-coq 43

Année 4 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Association de cultures : Pois d'hiver Fort Chénopode -10 Mouron -10 Panic pied-de-coq -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Nov-d1 Chénopode -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1	250 gr/m ² Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 12 cm Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Variété Très couvrante Chénopode -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0