

Exploitation : GAEC des Raillis
 Parcelle : Poulainville
 Type de sol : Calcisols

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	56
Vulpin	20
Folleavoine	25

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d1	Association de cultures : Tournesol Fort	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	20 gr/m ²	
Matricaire 45 Vulpin 28 Folleavoine 69	Matricaire -10 Vulpin -10 Folleavoine -10	Matricaire 0 Vulpin 0 Folleavoine 0	Matricaire 0 Vulpin 0 Folleavoine 0	Matricaire 0 Vulpin 0 Folleavoine 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 34 Vulpin 17 Folleavoine 58	
Matricaire 0 Vulpin 0 Folleavoine 0	Matricaire -1 Vulpin -1 Folleavoine -1	Matricaire 0 Vulpin 0 Folleavoine 0			

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	20 gr/m²
Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folleavoine 0	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Folleavoine 0	Folleavoine -2	Folleavoine 0		Folleavoine 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	20 gr/m²
Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folleavoine 0	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine 0		Folleavoine 0

Année 4 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Tournesol Fort	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1	Mar-d2	230 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 34
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 20
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 69

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	200 gr/m ²
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 25
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 74
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0		Folle-avoine 24

Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	250 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 13 Vulpin 65 Folle-avoine 6
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 7 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	230 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 38	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Avr-d2		Matricaire 41 Vulpin 31 Folle-avoine 82
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4		