

Exploitation : SCEA Des Trois Mares
 Parcelle : Ilôt 21
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	54
Ray-grass	11
Paturin	53

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 8 Ray-grass 35 Paturin 19	Chénopode -4 Ray-grass -4 Paturin -4	Chénopode -1 Ray-grass -4 Paturin -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Chénopode 1 Ray-grass 24 Paturin 11
Chénopode -2 Ray-grass -2 Paturin -2	Chénopode -1 Ray-grass -1 Paturin -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0		

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d1	Fév-d1	10 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 38	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mai-d1	Chénopode 63 Ray-grass 25 Paturin 35
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 15	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 7
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d1	Fév-d1	10 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -3	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Chénopode 53
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Ray-grass 1
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Paturin 41
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		