

Exploitation : SCEA Des Trois Mares
 Parcelle : îlot 21
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	46
Ray-grass	11
Paturin	46

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 8 Ray-grass 35 Paturin 19	Chénopode -4 Ray-grass -4 Paturin -4	Chénopode -1 Ray-grass -4 Paturin -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Chénopode 0 Ray-grass 23 Paturin 10
Chénopode -2 Ray-grass -2 Paturin -2	Chénopode -1 Ray-grass -1 Paturin -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0		

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Mar-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d1	Fév-d2	10 gr/m ²
Chénopode 66 Ray-grass 33 Paturin 38	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Chénopode -6 Ray-grass -4 Paturin -3	Chénopode -1 Ray-grass -3 Paturin -2	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0
Entre rangs 45 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d3 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mai-d3	Score annuel
Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Chénopode -1 Ray-grass -1 Paturin -1	Chénopode -6 Ray-grass -3 Paturin -4		Chénopode 52 Ray-grass 22 Paturin 29

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	200 gr/m ²
Chénopode 6 Ray-grass 7 Paturin 15	Chénopode -4 Ray-grass -4 Paturin -4	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0	Chénopode -1 Ray-grass -4 Paturin -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 0
Entre rangs 12 cm	Variété Moyennement couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1	Désherbage chimique Avr-d1	Score annuel
Chénopode -2 Ray-grass -2 Paturin -2	Chénopode -1 Ray-grass -1 Paturin -1	Chénopode -2 Ray-grass -1 Paturin -1		Chénopode 0 Ray-grass 0 Paturin 5

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d1	Fév-d1	10 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0
Entre rangs				
45 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode -2	Chénopode -1	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1	Mai-d1	Chénopode 47
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Houe rotative : Mai-d2		Ray-grass 4
Paturin -2	Paturin -1	Herse étrille :		Paturin 36
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -8		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -1		
Paturin -2	Paturin -1	Paturin -6		