

Exploitation : Ferme d'Égreville
 Parcelle : Terre à la vache
 Type de sol : Limon profond battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|------------------|----------|
| Datura stramoine | 0 |
| Chénopode | 35 |
| Folle-avoine | 23 |
| Ray-grass | 13 |
| Vulpin | 11 |

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|--|---|
| Déc-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Nov-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Nov-d1 | 12.5 gr/m ² |
| Datura stramoine 0 Chénopode 1 Folle-avoine 6 Ray-grass 0 Vulpin 6 | Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass -1 Vulpin -1 | Datura stramoine -2 Chénopode -1 Folle-avoine -4 Ray-grass -4 Vulpin -5 | Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Très couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 1 Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Datura stramoine -2 Chénopode -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 | Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|---|---|
| Oct-d3 Datura stramoine 0 Chénopode 8 Folle-avoine 20 Ray-grass 35 Vulpin 35 | Association de cultures : Aucune Faible Datura stramoine -4 Chénopode -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 | Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini Datura stramoine -1 Chénopode -1 Folle-avoine -2 Ray-grass -5 Vulpin -6 | Aoû-d3 Datura stramoine -2 Chénopode -2 Folle-avoine -4 Ray-grass -6 Vulpin -6 | 300 gr/m ² Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Non couvrante Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Bineuse : Mar-d2 Fév-d1 Jan-d2 Houe rotative : Déc-d3 Déc-d1 Nov-d2 Herse étrille : Nov-d1 Datura stramoine 0 Chénopode -3 Folle-avoine -6 Ray-grass -4 Vulpin -5 | | Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 3 Ray-grass 16 Vulpin 14 |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|---|--|
| Mar-d2 Datura stramoine 0 Chénopode 64 Folle-avoine 90 Ray-grass 35 Vulpin 38 | Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine -4 Chénopode -2 Folle-avoine 0 Ray-grass -1 Vulpin 0 | Déc-d1 Datura stramoine -2 Chénopode -1 Folle-avoine -3 Ray-grass -3 Vulpin -4 | 55 gr/m ² Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 18 cm Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Variété Non couvrante Datura stramoine 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1 Aoû-d2 Datura stramoine -15 Chénopode -8 Folle-avoine -4 Ray-grass -5 Vulpin -4 | Désherbage chimique | Score annuel Datura stramoine 0 Chénopode 53 Folle-avoine 83 Ray-grass 26 Vulpin 29 |