

Exploitation : Ferme d'Égreville
Parcelle : Terre à la vache
Type de sol : Limon profond battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Datura stramoine	0	
Chénopode	35	
Chénopode hybride	43	

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis Déc-d3 Datura stramoine : 0 Chénopode : 1 Chénopode hybride : 2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Chénopode hybride : 0	Interculture Date des faux semis : Nov-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Chénopode hybride : 0	Date de labour Nov-d1 Datura stramoine : -2 Chénopode : -1 Chénopode hybride : -1	Densité de semis 50 gr/m² Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Chénopode hybride : 0
Entre rangs Non défini Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Chénopode hybride : 0	Variété Très couvrante Datura stramoine : -2 Chénopode : -2 Chénopode hybride : -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Chénopode hybride : 0	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Chénopode hybride : 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Datura stramoine 0 Chénopode 8 Chénopode hybride 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Datura stramoine -4 Chénopode -4 Chénopode hybride -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine -1 Chénopode -1 Chénopode hybride 0	Date de labour Aoû-d3 Datura stramoine -2 Chénopode -2 Chénopode hybride -1	Densité de semis 300 gr/m² Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0
Entre rangs Non défini Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Variété Non couvrante Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d2 Fév-d1 Jan-d2 Houe rotative : Nov-d2 Déc-d1 Déc-d3 Herse étrille : Nov-d1 Datura stramoine 0 Chénopode -3 Chénopode hybride -4	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0

Année 3 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Datura stramoine 0 Chénopode 64 Chénopode hybride 81	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine -4 Chénopode -2 Chénopode hybride -2	Date de labour Déc-d1 Datura stramoine -2 Chénopode -1 Chénopode hybride -1	Densité de semis 55 gr/m² Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0
Entre rangs 18 cm Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Variété Non couvrante Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d2 Sep-d1 Datura stramoine -15 Chénopode -8 Chénopode hybride -8	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine 0 Chénopode 53 Chénopode hybride 70