



Exploitation : EARL Baudoin
Parcelle : Buré
Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	3	
Brome mou	0	
Ray-grass	1	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Brome mou 11</p> <p>Ray-grass 19</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d3</p> <p>Date de destruction : Mar-d2</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Brome mou -5</p> <p>Ray-grass -7</p>	<p>Avr-d1</p> <p>Vulpin -11</p> <p>Brome mou -9</p> <p>Ray-grass -9</p>	<p>10 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Ray-grass -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Brome mou -1</p> <p>Ray-grass -0</p>	<p>Mai-d1</p>	<p>Vulpin 4</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 1</p>