



Odera 2

Exploitation : MZ_1_HdF_DUBOIS
Parcelle : HARICOT
Type de sol : Limon-battant

Commentaires :

Parcelle suivi par l'UNILET pour les expés

Historique très complet remontant à 2003 à trouver au lien tux :
file:///192.168.100.10/commun/Projets/Adventurh/5_PROJETS_ASSOCIES/3_GAROTOX/Action_1_Connaissances_Adventices/Action_1A_Entretiens_Agriculteurs/2_Donnees_enq

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	82	
Ray-grass	18	
Datura stramoine	67	
Morelle	78	
Mouron	95	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis Mar-d2 Chénopode 71 Ray-grass 35 Datura stramoine 11 Morelle 11 Mouron 67	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Interculture Date des faux semis : Aucune Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Ray-grass -7 Datura stramoine -4 Morelle -3 Mouron -2	Densité de semis 10 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	
Entre rangs 45 cm Chénopode -2 Ray-grass -2 Datura stramoine -2 Morelle -2 Mouron -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Désherbage chimique Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3	Score annuel Chénopode 67 Ray-grass 26 Datura stramoine 5 Morelle 6 Mouron 63	
Année 2 - Blé d'hiver					
Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Ray-grass 52 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Ray-grass -4 Datura stramoine -4 Morelle -4 Mouron -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Ray-grass -4 Datura stramoine -2 Morelle -2 Mouron -1	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Densité de semis 250 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Ray-grass -1 Datura stramoine -1 Morelle -1 Mouron -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 4 Ray-grass 43 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	

Année 3 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 68</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Datura stramoine 36</div> <div>Morelle 36</div> <div>Mouron 100</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -3</div> <div>Mouron -2</div>	Densité de semis 3.7 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 90 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 65</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Datura stramoine 33</div> <div>Morelle 33</div> <div>Mouron 98</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 2</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Mouron -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d3</div> <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Mouron -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Mouron -1</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 4</div> <div>Ray-grass 43</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>

Année 5 - Maïs

Date de semis <div>Jun-d1</div> <div>Chénopode 43</div> <div>Ray-grass 10</div> <div>Datura stramoine 122</div> <div>Morelle 122</div> <div>Mouron 71</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Mai-d1</div> <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Datura stramoine -0</div> <div>Morelle -0</div> <div>Mouron -5</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Morelle -3</div> <div>Mouron -2</div>	Densité de semis 30 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Mouron -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Mouron 0</div>	Désherbage chimique <div>Jul-d2</div> <div>Jul-d1</div> <div>Jun-d3</div> <div>Jun-d2</div> <div>Jun-d1</div>	Score annuel <div>Chénopode 36</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Datura stramoine 116</div> <div>Morelle 117</div> <div>Mouron 62</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 43
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Nov-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	3.7 gr/m²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d3	Chénopode 65
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 33
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 33
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 98
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 5	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 48	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 1
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 42
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

Année 9 - Mais

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	10 gr/m²
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Datura stramoine 11	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 11	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 67	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d3 Avr-d1 Mar-d3	Chénopode 67
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 26
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 5
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 6
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 63
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

Année 10 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 43
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

Année 11 - Mais

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	3.7 gr/m²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d3	Chénopode 65
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 33
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 33
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 98
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 12 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 43
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

Année 13 - Mais

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	30 gr/m²
Chénopode 43	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 10	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Datura stramoine 122	Datura stramoine 0	Datura stramoine -0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 122	Morelle 0	Morelle -0	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 71	Mouron 0	Mouron -5	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d2 Jul-d1 Jun-d1 Jun-d2 Jun-d3	Chénopode 36
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 116
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 117
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 62
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

Année 14 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 43
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

Année 15 - Mais

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	3.7 gr/m²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d3	Chénopode 65
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 33
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 33
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 98
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 16 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Chénopode 5
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 43
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

Année 17 - Mais

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	10 gr/m²
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Datura stramoine 11	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 11	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 67	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3 Avr-d3	Chénopode 67
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Ray-grass 26
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Datura stramoine 5
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 6
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 63
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

Date de semis	
Jun-d1	
Chénopode	43
Ray-grass	10
Datura stramoine	122
Morelle	122
Mouron	71

Étouffement culture	
Association de cultures : Aucune Très faible	
Chénopode	0
Ray-grass	0
Datura stramoine	0
Morelle	0
Mouron	0

Interculture	
Date des faux semis : Mai-d1 Avr-d1	
Date de semis du couvert : Non définie	
Date de destruction : Non définie	
Chénopode	-6
Ray-grass	-3
Datura stramoine	-0
Morelle	-0
Mouron	-8

Date de labour	
Jan-d2	
Chénopode	-2
Ray-grass	-6
Datura stramoine	-4
Morelle	-3
Mouron	-2

Densité de semis	
30 gr/m²	
Chénopode	0
Ray-grass	0
Datura stramoine	0
Morelle	0
Mouron	0

Entre rangs	
45 cm	
Chénopode	-2
Ray-grass	-2
Datura stramoine	-2
Morelle	-2
Mouron	-2

Variété	
Non couvrante	
Chénopode	0
Ray-grass	0
Datura stramoine	0
Morelle	0
Mouron	0

Désherbage mécanique	
Bineuse : Jul-d1	
Houe rotative :	
Herse étrille :	
Chénopode	0
Ray-grass	0
Datura stramoine	0
Morelle	0
Mouron	0

Désherbage chimique			
Jul-d2	Jun-d1	Jun-d2	Jun-d3
Jul-d1			

Score annuel	
Chénopode	33
Ray-grass	0
Datura stramoine	116
Morelle	117
Mouron	59