

Scénario :
cult printemps +BTP
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SAPINS_Scenar_1 = +binage sur
PSPROFF
SAPINS
argilo calcaire - limon (AI)

Commentaires :

simulation réelle sur cas type Proffit

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	43 (45)
Chénopode hybride	49 (51)
Ray-grass	26 (26)
Vulpin	23 (23)
Renouée liseron	23 (26)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Août-d3</p> <p>Chénopode 31</p> <p>Chénopode hybride 3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Chénopode hybride -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Renouée liseron -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Août-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Chénopode hybride -1</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>40 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>25 cm</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Chénopode hybride -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Chénopode hybride -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Renouée liseron -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 20</p> <p>Chénopode hybride 0</p> <p>Ray-grass 84</p> <p>Vulpin 78</p> <p>Renouée liseron 0</p>

Année 2 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Chénopode 5	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0
Ray-grass 48	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0		Chénopode hybride 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 48
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie	Déc-d1	11 gr/m²
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Chénopode hybride 73	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 54
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -3		Chénopode hybride 69
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 32
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée liseron 29

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode hybride 8	Chénopode hybride -4	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Chénopode hybride -2	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0		Chénopode hybride 1
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 23
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	25 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode hybride 72	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -1	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Chénopode 49
Chénopode hybride 0	Chénopode hybride 0	Chénopode hybride -6		Chénopode hybride 65
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 8
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		Renouée liseron 120

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Chénopode 6

Chénopode hybride 8

Ray-grass 18

Vulpin 14

Renouée liseron 1

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Chénopode hybride -4

Ray-grass -4

Vulpin -4

Renouée liseron -4

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d2 Nov-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -1

Chénopode hybride 0

Ray-grass -6

Vulpin -6

Renouée liseron 0

Date de labour

Pas de labour

Chénopode 0

Chénopode hybride 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Densité de semis

250 gr/m²

Chénopode 0

Chénopode hybride 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Entre rangs

12 cm

Chénopode -2

Chénopode hybride -2

Ray-grass -2

Vulpin -2

Renouée liseron -2

Variété

Non couvrante

Chénopode 0

Chénopode hybride 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode 0

Chénopode hybride 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode 0

Chénopode hybride 2

Ray-grass 6

Vulpin 2

Renouée liseron 0