

Exploitation : 1
Parcelle : 2.1
Type de sol : limons

Commentaires :

Premier ITK original

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	16	
Chénopode	16	
Mercuriale	16	
Fumeterre	34	
Folle-avoine	18	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Août-d3</p> <p>Agrostis 8</p> <p>Chénopode 31</p> <p>Mercuriale 10</p> <p>Fumeterre 30</p> <p>Folle-avoine 28</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Agrostis -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Mercuriale -6</p> <p>Fumeterre -6</p> <p>Folle-avoine -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Août-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Fumeterre -1</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>35 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17.5 cm</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Mercuriale -2</p> <p>Fumeterre -2</p> <p>Folle-avoine -2</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mercuriale -1</p> <p>Fumeterre -1</p> <p>Folle-avoine -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Fumeterre 0</p> <p>Folle-avoine 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Sep-d1</p> <p>Août-d3</p> <p>Août-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Chénopode 20</p> <p>Mercuriale 1</p> <p>Fumeterre 20</p> <p>Folle-avoine 19</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Agrostis 32	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 15	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 32	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 35	Fumeterre -6	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Fév-d3 Fév-d2	Agrostis 25
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Chénopode 7
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Mercuriale 25
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Fumeterre 27
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Folle-avoine 27
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Agrostis 25	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 25	Fumeterre -10	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Fév-d3 Fév-d2	Agrostis 14
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Mercuriale 21
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Fumeterre 14
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Folle-avoine 10
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		