

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

EARL de Malaise
Le Plateau
limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	37	
Ray-grass	28	
Folle-avoine	24	
Renouée persicaire	11	
Vulpin	23	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Folle-avoine 90</p> <p>Renouée persicaire 60</p> <p>Vulpin 38</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Folle-avoine -10</p> <p>Renouée persicaire -10</p> <p>Vulpin -10</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1</p> <p>Date de destruction : Nov-d1</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Nov-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Vulpin -5</p>	<p>10 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Très couvrante</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Bineuse : Jun-d2</p> <p>Houe rotative : Avr-d2</p> <p>Herse étrille : Avr-d2</p> <p>Chénopode -9</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Folle-avoine -8</p> <p>Renouée persicaire -15</p> <p>Vulpin -3</p>	<p>Jun-d2</p> <p>Mai-d2</p> <p>Avr-d2</p> <p>Mar-d2</p>	<p>Chénopode 42</p> <p>Ray-grass 15</p> <p>Folle-avoine 67</p> <p>Renouée persicaire 31</p> <p>Vulpin 18</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	200 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Mar-d3 Avr-d3	
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 1
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	40 gr/m²
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -6	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Sep-d3	
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 20
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 79
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 16
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 73