

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Hacken
Wulwes kamp
Sand

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	53	
Stellaire intermédiaire	28	
Lamier pourpre	52	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Mai-d1 Chénopode 57 Stellaire intermédiaire 34 Lamier pourpre 58	Étouffement culture Association de cultures : Maïs Fort Chénopode -10 Stellaire intermédiaire -10 Lamier pourpre -10	Interculture Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Avr-d1 Date de destruction : Sep-d2 Chénopode -3 Stellaire intermédiaire -3 Lamier pourpre -3	Date de labour Mar-d3 Chénopode -5 Stellaire intermédiaire -4 Lamier pourpre -7	Densité de semis 9 gr/m² Chénopode 0 Stellaire intermédiaire 0 Lamier pourpre 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0 Stellaire intermédiaire 0 Lamier pourpre 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Stellaire intermédiaire 0 Lamier pourpre 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Chénopode -4 Stellaire intermédiaire -2 Lamier pourpre -5	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 35 Stellaire intermédiaire 15 Lamier pourpre 34