

Exploitation : Goenvec
 Parcelle : Larris
 Type de sol : limono argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	41
Chénopode	37
Folle-avoine	15

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	38 gr/m ²
Ray-grass 88 Chénopode 34 Folle-avoine 22	Ray-grass -6 Chénopode -6 Folle-avoine -6	Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 82 Chénopode 28 Folle-avoine 16
Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Ray-grass 63 Chénopode 9 Folle-avoine 28
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Ray-grass 35 Chénopode 0 Folle-avoine 1
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		
Folle-avoine -1	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	8 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 17 Chénopode 61 Folle-avoine 54
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -2
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	Ray-grass 39 Chénopode 2 Folle-avoine 16
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Ray-grass 26
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine -1	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		