





Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

PACIA  
Larris  
Limono argileux à silex

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	48 
Ray-grass	39 
Folle-avoine	14 
Coquelicot	70 

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 11</p> <p>Ray-grass : 88</p> <p>Folle-avoine : 22</p> <p>Coquelicot : 28</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : -6</p> <p>Ray-grass : -6</p> <p>Folle-avoine : -6</p> <p>Coquelicot : -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Folle-avoine : 0</p> <p>Coquelicot : 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Folle-avoine : 0</p> <p>Coquelicot : 0</p>	<p>38 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Folle-avoine : 0</p> <p>Coquelicot : 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>35 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Folle-avoine : 0</p> <p>Coquelicot : 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Folle-avoine : 0</p> <p>Coquelicot : 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Folle-avoine : 0</p> <p>Coquelicot : 0</p>		<p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 5</p> <p>Ray-grass : 82</p> <p>Folle-avoine : 16</p> <p>Coquelicot : 22</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>2</div> <div>Ray-grass</div> <div>69</div> <div>Folle-avoine</div> <div>34</div> <div>Coquelicot</div> <div>71</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-4</div> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-4</div> <div>Coquelicot</div> <div>-4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Ray-grass</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Coquelicot</div> <div>-1</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Ray-grass</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Coquelicot</div> <div>-1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Sep-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>63</div> <div>Folle-avoine</div> <div>28</div> <div>Coquelicot</div> <div>65</div>

## Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>48</div> <div>Folle-avoine</div> <div>13</div> <div>Coquelicot</div> <div>59</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-10</div> <div>Ray-grass</div> <div>-10</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-10</div> <div>Coquelicot</div> <div>-10</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>-0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Densité de semis</b> 301.05 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Ray-grass</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Coquelicot</div> <div>-1</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Ray-grass</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Coquelicot</div> <div>-1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Sep-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>36</div> <div>Folle-avoine</div> <div>2</div> <div>Coquelicot</div> <div>47</div>

## Année 4 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <div>Avr-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>92</div> <div>Ray-grass</div> <div>12</div> <div>Folle-avoine</div> <div>44</div> <div>Coquelicot</div> <div>29</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-0</div> <div>Ray-grass</div> <div>-5</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Coquelicot</div> <div>-2</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Densité de semis</b> 8 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>
<b>Entre rangs</b> 75 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Ray-grass</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Coquelicot</div> <div>-1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mar-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>90</div> <div>Ray-grass</div> <div>6</div> <div>Folle-avoine</div> <div>42</div> <div>Coquelicot</div> <div>26</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>2</div> <div>Ray-grass</div> <div>52</div> <div>Folle-avoine</div> <div>26</div> <div>Coquelicot</div> <div>64</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-4</div> <div>Ray-grass</div> <div>-4</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-4</div> <div>Coquelicot</div> <div>-4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>-5</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Coquelicot</div> <div>-3</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Densité de semis</b> 351.03 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Coquelicot</div> <div>-2</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Ray-grass</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-1</div> <div>Coquelicot</div> <div>-1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>40</div> <div>Folle-avoine</div> <div>17</div> <div>Coquelicot</div> <div>55</div>

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Ray-grass 48

Folle-avoine 13

Coquelicot 59

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Ambroisie à feuilles d'armoise

-10

Ray-grass -10

Folle-avoine -10

Coquelicot -10

### Interculture

Date des faux semis :

Oct-d1 Sep-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Ray-grass -9

Folle-avoine -4

Coquelicot -6

### Date de labour

Pas de labour

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

### Densité de semis

320 gr/m²

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

### Entre rangs

15 cm

Ambroisie à feuilles d'armoise

-1

Ray-grass -1

Folle-avoine -1

Coquelicot -1

### Variété

Moyennement couvrante

Ambroisie à feuilles d'armoise

-1

Ray-grass -1

Folle-avoine -1

Coquelicot -1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

### Désherbage chimique

Oct-d2

### Score annuel

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Ray-grass 27

Folle-avoine 0

Coquelicot 41