


Exploitation : LaSalle  
Parcelle : Le Larris  
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :


## Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque :   |
|--------------|--|
| Ray-grass    | 24  |

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Date de semis</b><br><input type="text" value="Oct-d3"/><br>Ray-grass 31 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen<br>Ray-grass -6 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><input type="text" value="Non définie"/><br>Date de destruction :<br><input type="text" value="Non définie"/><br>Ray-grass 0 | <b>Date de labour</b><br><input type="text" value="Pas de labour"/><br>Ray-grass 0 | <b>Densité de semis</b><br>38 gr/m²<br>Ray-grass 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>15 cm<br>Ray-grass -2                                 | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Ray-grass 0   | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br><input type="text" value="Sep-d2"/><br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0   | <b>Désherbage chimique</b>   | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 23                |

### Année 2 - Blé d'hiver

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <b>Date de semis</b><br><input type="text" value="Oct-d3"/><br>Ray-grass 35 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br>Ray-grass -4 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><input type="text" value="Non définie"/><br>Date de destruction :<br><input type="text" value="Non définie"/><br>Ray-grass 0 | <b>Date de labour</b><br><input type="text" value="Pas de labour"/><br>Ray-grass 0 | <b>Densité de semis</b><br>250 gr/m²<br>Ray-grass 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>15 cm<br>Ray-grass -1                                 | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Ray-grass -1                                     | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br><input type="text" value="Sep-d2"/><br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0   | <b>Désherbage chimique</b><br><input type="text" value="Nov-d3"/>                  | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 29                 |

### Année 3 - Orge d'hiver

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <b>Date de semis</b><br>Nov-d1<br>Ray-grass 15 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort<br>Ray-grass -10 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass 0 | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Ray-grass 0 | <b>Densité de semis</b><br>301.05 gr/m²<br>Ray-grass 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>15 cm<br>Ray-grass -1    | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Ray-grass -1                                    | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Sep-d2<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0  | <b>Désherbage chimique</b><br>Sep-d3                  | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 3                     |

### Année 4 - Tournesol

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Date de semis</b><br>Avr-d2<br>Ray-grass 19 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br>Ray-grass 0 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass 0 | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Ray-grass 0 | <b>Densité de semis</b><br>7.95 gr/m²<br>Ray-grass 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>15 cm<br>Ray-grass 0     | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Ray-grass 0  | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Sep-d2<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0  | <b>Désherbage chimique</b>                            | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 19                  |

### Année 5 - Blé d'hiver

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <b>Date de semis</b><br>Oct-d2<br>Ray-grass 52 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br>Ray-grass -4 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass 0 | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Ray-grass 0 | <b>Densité de semis</b><br>351.03 gr/m²<br>Ray-grass -2 |
| <b>Entre rangs</b><br>15 cm<br>Ray-grass -1    | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Ray-grass -1                                     | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Sep-d2<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0  | <b>Désherbage chimique</b><br>Oct-d2                  | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 44                     |

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Ray-grass 48

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Ray-grass -10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass 0

### Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

### Densité de semis

Non défini

Ray-grass 0

### Entre rangs

15 cm

Ray-grass -1

### Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass -1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Sep-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass 37