

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Larris  
Type de sol : Limono argileux à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	45	
Ray-grass	42	
Vulpin	38	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Gaillet 13 Ray-grass 88 Vulpin 68	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Aoû-d2 Gaillet -4 Ray-grass -5 Vulpin -5	<b>Densité de semis</b> 380 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Très couvrante Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Aoû-d3 Aoû-d2	<b>Score annuel</b> Gaillet 1 Ray-grass 75 Vulpin 55

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 35</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> Non défini <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Oct-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Aoû-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Gaillet 87</div> <div>Ray-grass 29</div> <div>Vulpin 29</div>

## Année 3 - Aucune

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Gaillet 92</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Vulpin 83</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Densité de semis</b> 301.05 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> Non défini <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Jul-d1</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d2</div> <div>Sep-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Gaillet 92</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Vulpin 83</div>

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Date de destruction :	Jul-d3	79545 gr/m²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d2	Gaillet 0 Ray-grass 16 Vulpin 17
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Date de destruction :	Pas de labour	351.03 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d3 Oct-d2	Gaillet 91 Ray-grass 46 Vulpin 54
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Gaillet	95
Ray-grass	48
Vulpin	56

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Gaillet	-10
Ray-grass	-10
Vulpin	-10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Densité de semis

Non défini

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Entre rangs

Non défini

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Sep-d3

Gaillet	0
Ray-grass	0
Vulpin	0

### Désherbage chimique

Nov-d1

Oct-d2

### Score annuel

Gaillet	85
Ray-grass	38
Vulpin	46