

Exploitation : FdB  
 Parcelle : Larris  
 Type de sol : Limoneux argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	28
Vulpin	23
Gaillet	27

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs				
35 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Nov-d3	Ray-grass 77
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Oct-d2	Vulpin 57
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Sep-d1	Gaillet 2
Variété				
Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :				
Ray-grass 0				
Vulpin 0				
Gaillet 0				

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -6	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Avr-d2	Nov-d2 Sep-d2	Ray-grass 37 Vulpin 47 Gaillet 89
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d1 Sep-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Oct-d3	Pas de labour	301 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Avr-d2	Oct-d3 Sep-d3	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 62
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d2	Pas de labour	85 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet -4	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs				
60 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Bineuse : Jun-d2 Mai-d2	Jul-d2 Aoû-d2	Ray-grass 13
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0		Vulpin 15
Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin -1		Gaillet 0
		Gaillet 0		