

Exploitation : ferme du bois  
Parcelle : Larris  
Type de sol : limono argileux à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |  |
|--------------|----------|--|
| Gaillet      | 16       |  |
| Ray-grass    | 59       |  |
| Vulpin       | 47       |  |

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <b>Date de semis</b><br>Jul-d3<br>Gaillet 1<br>Ray-grass 53<br>Vulpin 25 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen<br>Gaillet -6<br>Ray-grass -6<br>Vulpin -6 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Aoû-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Gaillet 0<br>Ray-grass -2<br>Vulpin 0 | <b>Date de labour</b><br>Jul-d3<br>Gaillet -4<br>Ray-grass -4<br>Vulpin -4           | <b>Densité de semis</b><br>40 gr/m²<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>Non défini<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0 | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0   | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0   | <b>Désherbage chimique</b><br>Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3<br>Oct-d3 Sep-d2 Sep-d1<br>Aoû-d2 | <b>Score annuel</b><br>Gaillet 0<br>Ray-grass 42<br>Vulpin 15               |

## Année 2 - Blé d'hiver

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Date de semis</b><br>Sep-d2<br>Gaillet 66<br>Ray-grass 96<br>Vulpin 111 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br>Gaillet -4<br>Ray-grass -4<br>Vulpin -4 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Sep-d3<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Gaillet -3<br>Ray-grass -5<br>Vulpin -6 | <b>Date de labour</b><br>Sep-d2<br>Gaillet -5<br>Ray-grass -6<br>Vulpin -8 | <b>Densité de semis</b><br>250 gr/m²<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>Non défini<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0   | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0  | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0   | <b>Désherbage chimique</b><br>Oct-d3 Oct-d2 Sep-d3<br>Oct-d1 Sep-d2        | <b>Score annuel</b><br>Gaillet 55<br>Ray-grass 80<br>Vulpin 94               |

## Année 3 - Orge d'hiver

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <b>Date de semis</b><br>Sep-d2<br>Gaillet 64<br>Ray-grass 92<br>Vulpin 108 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort<br>Gaillet -10<br>Ray-grass -10<br>Vulpin -10 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Oct-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Gaillet -4<br>Ray-grass -4<br>Vulpin -6 | <b>Date de labour</b><br>Sep-d3<br>Gaillet -6<br>Ray-grass -6<br>Vulpin -8 | <b>Densité de semis</b><br>301.05 gr/m²<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>Non défini<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0   | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0   | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Gaillet 0<br>Ray-grass 0<br>Vulpin 0   | <b>Désherbage chimique</b><br>Oct-d3 Oct-d2 Oct-d1<br>Sep-d3               | <b>Score annuel</b><br>Gaillet 44<br>Ray-grass 71<br>Vulpin 83                  |

## Année 4 - Tournesol

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <b>Date de semis</b><br><div>Mar-d2</div> <div>Gaillet 5</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 38</div> | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br><div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br><div>Avr-d1</div> Date de semis du couvert :<br><div>Non définie</div> Date de destruction :<br><div>Non définie</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> | <b>Date de labour</b><br><div>Mar-d3</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -6</div>                             | <b>Densité de semis</b><br>40 gr/m²<br><div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> |
| <b>Entre rangs</b><br>Non défini<br><div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>         | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br><div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>  | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>   | <b>Désherbage chimique</b><br><div>Mai-d3</div> <div>Mai-d2</div> <div>Mai-d1</div> <div>Jun-d1</div> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div> | <b>Score annuel</b><br><div>Gaillet 1</div> <div>Ray-grass 28</div> <div>Vulpin 30</div>               |

## Année 5 - Blé d'hiver

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <b>Date de semis</b><br><div>Sep-d2</div> <div>Gaillet 66</div> <div>Ray-grass 96</div> <div>Vulpin 111</div> | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible<br><div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br><div>Oct-d1</div> Date de semis du couvert :<br><div>Non définie</div> Date de destruction :<br><div>Non définie</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -6</div> | <b>Date de labour</b><br><div>Sep-d3</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -8</div>           | <b>Densité de semis</b><br>351.03 gr/m²<br><div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> |
| <b>Entre rangs</b><br>Non défini<br><div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>           | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br><div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>  | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div>   | <b>Désherbage chimique</b><br><div>Nov-d3</div> <div>Nov-d1</div> <div>Nov-d2</div> <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div> | <b>Score annuel</b><br><div>Gaillet 50</div> <div>Ray-grass 79</div> <div>Vulpin 91</div>                     |

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Août-d2

Gaillet 13

Ray-grass 88

Vulpin 68

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

Gaillet -10

Ray-grass -10

Vulpin -10

### Interculture

Date des faux semis :

Oct-d1

Date de semis du  
couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Gaillet -4

Ray-grass -4

Vulpin -6

### Date de labour

Sep-d3

Gaillet -6

Ray-grass -6

Vulpin -8

### Densité de semis

300 gr/m²

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

### Entre rangs

Non défini

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

### Variété

Non couvrante

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Gaillet 0

Ray-grass 0

Vulpin 0

### Désherbage chimique

Nov-d2

Oct-d3

Nov-d1

Oct-d2

### Score annuel

Gaillet 0

Ray-grass 68

Vulpin 43