

Exploitation : Du bois
Parcelle : Les forêts2
Type de sol : Limon argileux sur craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	43	
Folle-avoine	22	
Coquelicot	66	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Folle-avoine 28 Coquelicot 41	Étouffement culture Association de cultures : Féverole de printemps Moyen Ray-grass -6 Folle-avoine -6 Coquelicot -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0	Densité de semis 45 gr/m² Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0
Entre rangs 30 cm Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Coquelicot -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 88 Folle-avoine 20 Coquelicot 33

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Folle-avoine 20 Coquelicot 55	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Folle-avoine -4 Coquelicot -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 Folle-avoine -1 Coquelicot -4	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0	Densité de semis 260 gr/m² Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Coquelicot -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 25 Folle-avoine 13 Coquelicot 46

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66 Folle-avoine 21 Coquelicot 66	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Folle-avoine -10 Coquelicot -10	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -10 Folle-avoine -3 Coquelicot -4	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0	Densité de semis 220 gr/m² Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Coquelicot -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 44 Folle-avoine 6 Coquelicot 49

Année 4 - Maïs

Date de semis

Avr-d1

Ray-grass 27

Folle-avoine 70

Coquelicot 45

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d2

Date de semis du couvert :

Aoû-d2

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass -2

Folle-avoine -5

Coquelicot -2

Date de labour

Jan-d3

Ray-grass -2

Folle-avoine -2

Coquelicot -1

Densité de semis

103 gr/m²

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Entre rangs

75 cm

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Folle-avoine 0

Coquelicot 0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass 24

Folle-avoine 64

Coquelicot 42