

Exploitation : La ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : cranette

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	33
Renouée des oiseaux	29

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Chénopode 31 Renouée des oiseaux 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Renouée des oiseaux -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 35 gr/m ² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 30 cm Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 22 Renouée des oiseaux 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Renouée des oiseaux 9	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 250 gr/m ² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique Avr-d1 Jan-d2	Score annuel Chénopode 5 Renouée des oiseaux 3

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	301.05 gr/m ²
Chénopode 9 Renouée des oiseaux 0	Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Sep-d3	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d1 Avr-d2 Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	7.5 gr/m ²
Chénopode 57 Renouée des oiseaux 92	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Chénopode -8 Renouée des oiseaux -13	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Mar-d2	Chénopode 49 Renouée des oiseaux 78
Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	351.03 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Oct-d2	Chénopode 4
Chénopode -1	Chénopode 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		