

Exploitation : ferme du bois
 Parcelle : Larris
 Type de sol : limon argileux à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	23
Matricaire	38

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Chénopode 27 Matricaire 30	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Matricaire -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Matricaire 0	Date de labour Aoû-d3 Chénopode -4 Matricaire -3 Chénopode 0 Matricaire 0	Densité de semis 45 gr/m ² Chénopode 0 Matricaire 0
Entre rangs 30 cm Chénopode -2 Matricaire -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage chimique Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3	Score annuel Chénopode 15 Matricaire 19

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Matricaire 29	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Matricaire -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -1 Matricaire -1	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Matricaire 0	Densité de semis 250 gr/m ² Chénopode 0 Matricaire 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Matricaire -1	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage chimique Oct-d2 Oct-d1	Score annuel Chénopode 5 Matricaire 23

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Chénopode 0 Matriaire 0	301.5 gr/m ² Chénopode 0 Matriaire 0
Chénopode 2 Matriaire 20	Chénopode -10 Matriaire -10	Chénopode -1 Matriaire -1		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d3	Chénopode 0 Matriaire 8
Chénopode -1 Matriaire -1	Chénopode 0 Matriaire 0	Chénopode 0 Matriaire 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Luzerne Fort	Date des faux semis : Avr-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d2	Avr-d3 Chénopode -5 Matriaire -3	8 gr/m ² Chénopode 0 Matriaire 0
Chénopode 52 Matriaire 36	Chénopode -10 Matriaire -10	Chénopode -3 Matriaire -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1	Chénopode 34 Matriaire 21
Chénopode 0 Matriaire 0	Chénopode 0 Matriaire 0	Chénopode 0 Matriaire 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2 Chénopode -3 Matriaire -3	400 gr/m ² Chénopode -2 Matriaire -2
Chénopode 6 Matriaire 23	Chénopode -4 Matriaire -4	Chénopode -0 Matriaire -1		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d3 Oct-d2	Chénopode 0 Matriaire 13
Chénopode -1 Matriaire -1	Chénopode 0 Matriaire 0	Chénopode 0 Matriaire 0		