

Exploitation : DARDOSSE
 Parcelle : Abbée1
 Type de sol : calcaire

Commentaires :

butte de blanc et fond de parcelle 78ha

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25
Chénopode	10
Laiteron rude	25
Renouée liseron	0

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d2 Ray-grass 92 Chénopode 21 Laiteron rude 24 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Autre culture d'hiver Très faible Ray-grass 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Aoû-d2 Ray-grass 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Date de labour Sep-d2 Ray-grass -6 Chénopode -2 Laiteron rude -2 Renouée liseron -3	Densité de semis 60 gr/m ² Ray-grass 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Renouée liseron 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2 Chénopode -2 Laiteron rude -2 Renouée liseron -2	Désherbage mécanique Bineuse : Nov-d3 Sep-d2 Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Ray-grass -5 Chénopode -2 Laiteron rude -2 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Oct-d2 Avr-d2 Mar-d2 Ray-grass 79 Chénopode 16 Laiteron rude 18 Renouée liseron 0	Score annuel Ray-grass 79 Chénopode 16 Laiteron rude 18 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	400 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Fév-d2	Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 8
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -4		Laiteron rude 15
Laiteron rude -1	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron -5		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 23	Laiteron rude -10	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2	Mai-d2 Nov-d3 Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Laiteron rude 10
Laiteron rude -1	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		