

Exploitation : Gobert antoine
 Parcelle : test
 Type de sol : limon-argileux

Commentaires :

j'en ai pas

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26
Vulpin	26
Gaillet	44
Chénopode	6

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97 Vulpin 103 Gaillet 42 Chénopode 27	Étouffement culture Association de cultures : Féverole d'hiver Fort Ray-grass -10 Vulpin -10 Gaillet -10 Chénopode -10	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 Vulpin -3 Gaillet 0 Chénopode -2	Date de labour Aoû-d2 Ray-grass -10 Vulpin -10 Gaillet -8 Chénopode -4	Densité de semis 45 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs 25 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Chénopode -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Oct-d3 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Déc-d1 Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Score annuel Ray-grass 70 Vulpin 77 Gaillet 21 Chénopode 8

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	240 gr/m ²
Ray-grass 7 Vulpin 8 Gaillet 75 Chénopode 6	Ray-grass -6 Vulpin -6 Gaillet -6 Chénopode -6	Ray-grass -5 Vulpin -4 Gaillet 0 Chénopode -2	Ray-grass -12 Vulpin -14 Gaillet -8 Chénopode -4	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1 Nov-d1	Fév-d1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 54 Chénopode 0
Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Chénopode -2	Ray-grass -1 Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet -3 Chénopode 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d1	Sep-d1	70 gr/m ²
Ray-grass 48 Vulpin 56 Gaillet 95 Chénopode 5	Ray-grass -10 Vulpin -10 Gaillet -10 Chénopode -10	Ray-grass -5 Vulpin -4 Gaillet 0 Chénopode -2	Ray-grass -12 Vulpin -14 Gaillet -8 Chénopode -4	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Déc-d1	Nov-d2	Ray-grass 17 Vulpin 24 Gaillet 67 Chénopode 0
Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Chénopode -2	Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Chénopode -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet -6 Chénopode 0		