

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

EARL d'Abancourt
La Terrasse 1
Argilo-silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome stérile	12	
Coquelicot	29	
Folle-avoine	13	
Ray-grass	19	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d2	450 gr/m²
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -8	Brome stérile -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -2
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile -5		Brome stérile 19
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Coquelicot 40
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		Folle-avoine 7
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Ray-grass 16

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d1 Brome stérile 5 Coquelicot 25 Folle-avoine 63 Ray-grass 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Brome stérile -10 Coquelicot -10 Folle-avoine -10 Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Jan-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2 Brome stérile 0 Coquelicot -0 Folle-avoine -0 Ray-grass 0	Date de labour Jan-d1 Brome stérile -6 Coquelicot -1 Folle-avoine -3 Ray-grass -3	Densité de semis 400 gr/m² Brome stérile -2 Coquelicot -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2
Entre rangs 20 cm Brome stérile 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d1 Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile -2 Coquelicot -4 Folle-avoine -9 Ray-grass -3	Désherbage chimique	Score annuel Brome stérile 0 Coquelicot 7 Folle-avoine 38 Ray-grass 0

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d1 Brome stérile 69 Coquelicot 19 Folle-avoine 14 Ray-grass 73	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Brome stérile -6 Coquelicot -6 Folle-avoine -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Brome stérile -1 Coquelicot -0 Folle-avoine 0 Ray-grass -1	Date de labour Jul-d2 Brome stérile -6 Coquelicot -2 Folle-avoine -3 Ray-grass -3	Densité de semis 300 gr/m² Brome stérile 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm Brome stérile -2 Coquelicot -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Brome stérile 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Aoû-d3 Herse étrille : Sep-d1 Brome stérile -15 Coquelicot -6 Folle-avoine -4 Ray-grass -13	Désherbage chimique	Score annuel Brome stérile 40 Coquelicot 3 Folle-avoine 0 Ray-grass 48