

Exploitation : GRIVOT
Parcelle : TD8-1
Type de sol : argile-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	26	
Vulpin	18	
Chénopode	31	
Coquelicot	36	
Matricaire	51	

Situation initiale :

Année 1 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Chénopode 34</p> <p>Coquelicot 28</p> <p>Matricaire 30</p>	<p>Association de cultures : Colza d'hiver Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Matricaire -6</p>	<p>Date des faux semis : Août-d1 Jul-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Matricaire -3</p>	<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>60 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Bineuse : Oct-d1 Sep-d1</p> <p>Houe rotative : Sep-d2 Oct-d3</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Oct-d2 Sep-d3</p>	<p>Ray-grass 75</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Chénopode 22</p> <p>Coquelicot 20</p> <p>Matricaire 21</p>

Année 2 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Blé d'hiver Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Sep-d1	Nov-d1	300 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 31	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Matricaire 15	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Déc-d1	Déc-d2 Mar-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 22
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 8

Année 3 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Orge de printemps Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Nov-d1	Fév-d1	350 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Chénopode 37	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 32	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Matricaire 42	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille : Mar-d3	Avr-d1 Mar-d2	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 15
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 31
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 27
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 37