

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA d'ecros ville
Roger
limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	31
Vulpin	28
Chénopode	64
Renouée des oiseaux	68
Matricaire	73

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Sep-d1</p> <p>Ray-grass 101</p> <p>Vulpin 107</p> <p>Chénopode 33</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p> <p>Matricaire 36</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p> <p>Matricaire -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Aoû-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Date de labour</p> <p>Sep-d1</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>230 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>13 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Matricaire -2</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 89</p> <p>Vulpin 97</p> <p>Chénopode 23</p> <p>Renouée des oiseaux 2</p> <p>Matricaire 28</p>

Année 2 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Ray-grass 19 Vulpin 21 Chénopode 63 Renouée des oiseaux 110 Matricaire 42	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mar-d2 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0	Avr-d2 Ray-grass -2 Vulpin -3 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -2 Matricaire -1	400 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Matricaire -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0		Ray-grass 16 Vulpin 18 Chénopode 60 Renouée des oiseaux 108 Matricaire 40

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 69 Vulpin 87 Chénopode 15 Renouée des oiseaux 9 Matricaire 32	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4 Matricaire -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Vulpin -4 Chénopode -2 Renouée des oiseaux 0 Matricaire -1	Oct-d1 Ray-grass -3 Vulpin -4 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Matricaire -1	230 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2 Matricaire -2	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Matricaire -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0		Ray-grass 55 Vulpin 72 Chénopode 6 Renouée des oiseaux 2 Matricaire 23

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Ray-grass 35 Vulpin 38 Chénopode 64 Renouée des oiseaux 123 Matricaire 48	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d2 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0	Mar-d2 Ray-grass -2 Vulpin -3 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Matricaire -1	12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Matricaire -1	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Vulpin -1 Chénopode -3 Renouée des oiseaux -4 Matricaire -2		Ray-grass 31 Vulpin 34 Chénopode 59 Renouée des oiseaux 117 Matricaire 45

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Ray-grass 18 Vulpin 14 Chénopode 6 Renouée des oiseaux 9 Matricaire 23	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4 Matricaire -4	Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -2 Vulpin -1 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire -1	Nov-d1 Ray-grass -2 Vulpin -3 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Matricaire -1	230 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2 Renouée des oiseaux -2 Matricaire -2	Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Matricaire -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Matricaire 0		Ray-grass 7 Vulpin 4 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 2 Matricaire 15

Année 6 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Ray-grass	19
Vulpin	21
Chénopode	68
Renouée des oiseaux	112
Matricaire	46

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0
Matricaire	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Août-d1

Date de destruction :

Fév-d2

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0
Matricaire	0

Date de labour

Fév-d2

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Chénopode	-1
Renouée des oiseaux	-1
Matricaire	-1

Densité de semis

240 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0
Matricaire	0

Entre rangs

90 cm

Ray-grass	0
Vulpin	0
Chénopode	0
Renouée des oiseaux	0
Matricaire	0

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Chénopode	-1
Renouée des oiseaux	-1
Matricaire	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d2

Mai-d2

Avr-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Chénopode	-8
Renouée des oiseaux	-11
Matricaire	-5

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	15
Vulpin	16
Chénopode	58
Renouée des oiseaux	99
Matricaire	39