

Exploitation : FLICK
Parcelle : 1
Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Parcelle en pente de 6,5 Ha

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	11
Folle-avoine	7
Séneçon vulgaire	38
Vulpin	32

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Chénopode 31</p> <p>Folle-avoine 28</p> <p>Séneçon vulgaire 25</p> <p>Vulpin 89</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Jul-d3</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Folle-avoine -3</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>35 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>25 cm</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Bineuse : Sep-d3</p> <p>Houe rotative : Oct-d1 Sep-d1</p> <p>Herse étrille : Fév-d3</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Folle-avoine -5</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Vulpin -16</p>	<p>Sep-d1</p>	<p>Chénopode 17</p> <p>Folle-avoine 13</p> <p>Séneçon vulgaire 10</p> <p>Vulpin 62</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Herse étrille : Nov-d3 Nov-d1	Nov-d3 Oct-d3	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -0		Folle-avoine 10
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -5		Séneçon vulgaire 27
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -2		Vulpin 17

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d3 Herse étrille : Déc-d1 Nov-d2	Nov-d2 Oct-d2	
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -5		Séneçon vulgaire 24
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 35