

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA de Pourcq les Tilleuls
la mare
limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	52	
Datura stramoine	9	
Ray-grass	36	
Vulpin	34	
Brome stérile	19	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d2	350 gr/m²
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 1	Datura stramoine -4	Datura stramoine -1	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -4	Brome stérile 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 9
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 73
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -3		Brome stérile 76

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1 Chénopode 58 Datura stramoine 0 Ray-grass 33 Vulpin 36 Brome stérile 16	Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Datura stramoine -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Brome stérile -10	Date des faux semis : Fév-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d1 Chénopode -1 Datura stramoine 0 Ray-grass -1 Vulpin -1 Brome stérile 0	Déc-d2 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Ray-grass -2 Vulpin -2 Brome stérile -3	330 gr/m² Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1 Chénopode -10 Datura stramoine 0 Ray-grass -5 Vulpin -6 Brome stérile -2		Chénopode 36 Datura stramoine 0 Ray-grass 16 Vulpin 17 Brome stérile 1

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Chénopode 63 Datura stramoine 19 Ray-grass 19 Vulpin 21 Brome stérile 11	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d3 Chénopode -3 Datura stramoine 0 Ray-grass -2 Vulpin -2 Brome stérile -1	Déc-d1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Ray-grass -2 Vulpin -2 Brome stérile -3	6 gr/m² Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
60 cm Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Brome stérile 0		Chénopode 59 Datura stramoine 18 Ray-grass 16 Vulpin 17 Brome stérile 8

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Chénopode 15</p> <p>Datura stramoine 1</p> <p>Ray-grass 69</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Brome stérile 93</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Datura stramoine -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Brome stérile -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Brome stérile -6</p>	<p>Aoû-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Brome stérile -4</p>	<p>350 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>20 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Brome stérile -3</p>		<p>Chénopode 9</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 56</p> <p>Vulpin 73</p> <p>Brome stérile 76</p>

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d1</p> <p>Chénopode 58</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 33</p> <p>Vulpin 36</p> <p>Brome stérile 16</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Datura stramoine -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Brome stérile -10</p>	<p>Date des faux semis : Fév-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d2</p> <p>Date de destruction : Déc-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Brome stérile -3</p>	<p>330 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Bineuse : Mar-d3</p> <p>Houe rotative : Avr-d2 Avr-d1</p> <p>Herse étrille : Avr-d2 Avr-d1</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Brome stérile -2</p>		<p>Chénopode 36</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 16</p> <p>Vulpin 17</p> <p>Brome stérile 1</p>

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis

Aoû-d3

Chénopode	31
Datura stramoine	30
Ray-grass	96
Vulpin	89
Brome stérile	105

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Chénopode	-6
Datura stramoine	-6
Ray-grass	-6
Vulpin	-6
Brome stérile	-6

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode	0
Datura stramoine	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Brome stérile	0

Date de labour

Aoû-d2

Chénopode	-1
Datura stramoine	-1
Ray-grass	-3
Vulpin	-3
Brome stérile	-4

Densité de semis

60 gr/m²

Chénopode	0
Datura stramoine	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Brome stérile	0

Entre rangs

30 cm

Chénopode	-2
Datura stramoine	-2
Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Brome stérile	-2

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Datura stramoine	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Brome stérile	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Oct-d1 Sep-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Chénopode	-2
Datura stramoine	-1
Ray-grass	-9
Vulpin	-12
Brome stérile	-12

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	20
Datura stramoine	20
Ray-grass	76
Vulpin	66
Brome stérile	81