

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : CDV
Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Folle-avoine | 9 | |
| Ray-grass | 37 | |
| Vulpin | 24 | |
| Chénopode | 42 | |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|---|--|---|
| <p>Août-d2</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Chénopode 34</p> | <p>Association de cultures : Luzerne Fort</p> <p>Folle-avoine -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Chénopode -10</p> | <p>Date des faux semis : Août-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode -2</p> | <p>Août-d3</p> <p>Folle-avoine -8</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Vulpin -12</p> <p>Chénopode -4</p> | <p>40 gr/m²</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>12.5 cm</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Chénopode -2</p> | <p>Très couvrante</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Chénopode -2</p> | <p>Bineuse : Houe rotative : Non définie</p> <p>Herse étrille : Non définie</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> | | <p>Folle-avoine 0</p> <p>Ray-grass 61</p> <p>Vulpin 42</p> <p>Chénopode 14</p> |

Année 2 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Date de semis Oct-d3 Folle-avoine 20 Ray-grass 35 Vulpin 35 Chénopode 8 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Folle-avoine -4 Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4 | Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Folle-avoine -1 Ray-grass -6 Vulpin -3 Chénopode -3 | Date de labour Oct-d1 Folle-avoine -9 Ray-grass -12 Vulpin -17 Chénopode -3 | Densité de semis 300 gr/m² Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs 12.5 cm Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2 | Variété Moyennement couvrante Folle-avoine -1 Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Folle-avoine -0 Ray-grass -2 Vulpin -1 Chénopode 0 | Désherbage chimique Oct-d1 | Score annuel Folle-avoine 2 Ray-grass 8 Vulpin 7 Chénopode 0 |

Année 3 - Orge de printemps

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Date de semis Aoû-d1 Folle-avoine 14 Ray-grass 73 Vulpin 43 Chénopode 35 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Folle-avoine -10 Ray-grass -10 Vulpin -10 Chénopode -10 | Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2 Folle-avoine 0 Ray-grass -2 Vulpin 0 Chénopode -2 | Date de labour Nov-d2 Folle-avoine -7 Ray-grass -7 Vulpin -10 Chénopode -2 | Densité de semis 300 gr/m² Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs 12.5 cm Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2 | Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Sep-d3 Fév-d2 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0 | Désherbage chimique Sep-d2 | Score annuel Folle-avoine 0 Ray-grass 52 Vulpin 22 Chénopode 19 |

Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|--|--|---------------------|------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Août-d2 Date de destruction : Nov-d2 | Nov-d2 | 10 gr/m² |
| Folle-avoine 69 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -7 | Folle-avoine 0 |
| Ray-grass 27 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass -7 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 55 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 62 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 18 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 19 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 61 |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------|---|---|---------------------|------------------|
| Août-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Août-d3 Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Août-d2 | 300 gr/m² |
| Folle-avoine 35 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine -7 | Folle-avoine 0 |
| Ray-grass 92 | Ray-grass -4 | Ray-grass -6 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 72 | Vulpin -4 | Vulpin -3 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Chénopode 40 | Chénopode -4 | Chénopode -3 | Chénopode -4 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Folle-avoine -2 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 21 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 69 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 53 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 27 |

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

| | |
|--------------|----|
| Folle-avoine | 13 |
| Ray-grass | 48 |
| Vulpin | 56 |
| Chénopode | 5 |

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

| | |
|--------------|-----|
| Folle-avoine | -10 |
| Ray-grass | -10 |
| Vulpin | -10 |
| Chénopode | -10 |

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

| | |
|--------------|---|
| Folle-avoine | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Chénopode | 0 |

Date de labour

Pas de labour

| | |
|--------------|---|
| Folle-avoine | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Chénopode | 0 |

Densité de semis

250 gr/m²

| | |
|--------------|---|
| Folle-avoine | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Chénopode | 0 |

Entre rangs

12.5 cm

| | |
|--------------|----|
| Folle-avoine | -2 |
| Ray-grass | -2 |
| Vulpin | -2 |
| Chénopode | -2 |

Variété

Non couvrante

| | |
|--------------|---|
| Folle-avoine | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Chénopode | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

| | |
|--------------|---|
| Folle-avoine | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Vulpin | 0 |
| Chénopode | 0 |

Désherbage chimique

Score annuel

| | |
|--------------|----|
| Folle-avoine | 1 |
| Ray-grass | 36 |
| Vulpin | 44 |
| Chénopode | 0 |